

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

1/9/1

DIALOG(R) File 351:Derwent WPI

(c) 2004 THOMSON DERWENT. All rts. reserv.

007514445

WPI Acc No: 1988-148378/ 198822

XRAM Acc No: C88-066052

New heteroaryl-substd. tri-fluoro-methylcarbonyl cpds. - with  
insecticidal activity prepd. e.g. by reaction of alkylene-diamine(s) with  
1,1-bismethylthio -4,4,4-trifluoro-1-buten-3-one

Patent Assignee: BAYER AG (FARB )

Inventor: ABBBINK J; BECKER B; HOMEYER B; MORIYA K; STENDEL W; WOLF H

Number of Countries: 009 Number of Patents: 003

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
DE 3639877	A	19880526	DE 3639877	A	19861121	198822 B
EP 268915	A	19880601	EP 87116505	A	19871109	198822
JP 63150275	A	19880622	JP 87285638	A	19871113	198831

Priority Applications (No Type Date): DE 3639877 A 19861121

Cited Patents: No-SR.Pub

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
DE 3639877	A		46		
EP 268915	A	G			

Designated States (Regional): BE CH DE FR GB IT LI NL

Abstract (Basic): DE 3639877 A

(A) Trifluoromethylcarbonyl derivs. of formula (I) are new: Het= opt. mono-or polysubstd. heterocaryl; R= H or 1-4C alkyl; X= O, S, N, NH or CR<sub>4</sub> (R<sub>4</sub>= H or alkyl); Y= N or CR<sub>3</sub> (R<sub>3</sub>= H or COCF<sub>3</sub>); R<sub>1</sub> + R<sub>2</sub> (together with the N-atom and X)= (B) Also new and claimed are the intermediates (III), (V). R<sub>1</sub>+R<sub>2</sub>= (Ia), (Ib), (Ic), (Id), (If), (Ii) or (Is) and (VII) (see 'preparation'). USE - (I) are useful as pesticides, especially insecticides. They are particularly suitable for use as foliar and soil insecticides with outstanding activity against cicadas, beetle larvae and aphids, and as ectoparasitocides.

Dwg.0/0

Title Terms: NEW; HETERO; ARYL; SUBSTITUTE; TRI; FLUORO; METHYL; CARBONYL; COMPOUND; INSECT; ACTIVE; PREPARATION; REACT; ALKYLENE; DI; AMINE; DI; METHYLTHIO; TRI; FLUORO; BUTYLENE; ONE

Derwent Class: C02

International Patent Class (Additional): A01N-043/50; A01N-043/72;

A61K-031/39; C07C-149/16; C07D-263/32; C07D-401/06; C07D-403/06;

C07D-405/06; C07D-409/06; C07D-413/06; C07D-417/06

File Segment: CPI

①9 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑫ Offenlegungsschrift  
⑪ DE 3639877 A1

⑳ Aktenzeichen: P 36 39 877.2  
㉑ Anmeldetag: 21. 11. 86  
㉒ Offenlegungstag: 26. 5. 88

Behörden Eigentum

⑤ Int. Cl. 4:  
C 07 D 401/06

C 07 D 417/06  
C 07 D 403/06  
C 07 D 413/06  
C 07 D 405/06  
C 07 D 409/06  
C 07 C 149/16  
A 61 K 31/395  
A 01 N 43/72  
A 01 N 43/48  
A 01 N 43/34  
C 07 D 263/32

DE 3639877 A1


⑤ // C07D 233:04,233:54,239:06,239:24,213:02,263:08,263:36,277:08,277:20,279:06,271:02,285:02,275:02,263:02,261:02 (A01N 43/72,57:02,47:30,47:10,37:00,29:00,63:02)

⑦1 Anmelder:  
Bayer AG, 5090 Leverkusen, DE

⑦2 Erfinder:  
Wolf, Hilmar, Dr., 4018 Langenfeld, DE; Abbink, Jan, Dr., 5600 Wuppertal, DE; Becker, Benedikt, Dr., 4020 Mettmann, DE; Homeyer, Bernhard, Dr., 5090 Leverkusen, DE; Stendel, Wilhelm, Dr., 5600 Wuppertal, DE; Moriya, Koichi, Tokio/Tokyo, JP

⑤4 Hetarylalkyl substituierte 5- und 6-Ringheterocyclen

Es werden neue hetarylalkylsubstituierte 5- und 6-Ringheterocyclen der Formel (I)



bereitgestellt,  
in welcher  
Het für gegebenenfalls einfach oder mehrfach substituiertes Hetaryl steht,  
R für Wasserstoff oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl steht,  
X für Sauerstoff, Schwefel, Stickstoff oder für die Gruppierungen






steht,  
wobei  
R<sup>4</sup> für Wasserstoff oder Alkyl steht,  
Y für Stickstoff oder den Rest



steht, worin

R<sup>3</sup> für Wasserstoff oder die Gruppierung -CO-CF<sub>3</sub> steht und R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> gemeinsam mit dem angrenzenden Stickstoffatom und dem Rest X für einen heterocyclischen Rest der Formel




R<sup>4</sup> die oben angegebene Bedeutung besitzt.  
Die Verbindungen (I) können nach verschiedenen im Anmeldungstext angegebenen Verfahren hergestellt werden und besitzen eine stark ausgeprägte insektizide und ektoparasitizide Wirksamkeit.

DE 3639877 A1

## Patentansprüche

## 1. Trifluormethylcarbonyl-Derivate der Formel I



(I)

in welcher

Het für gegebenenfalls einfach oder mehrfach substituiertes Hetaryl steht,

R für Wasserstoff oder C<sub>1</sub>–C<sub>4</sub>-Alkyl steht,










X für Sauerstoff, Schwefel, Stickstoff oder für die

Gruppierungen NH oder CR<sup>4</sup> steht,


worin

R<sup>4</sup> für Wasserstoff oder Alkyl steht,Y für Stickstoff oder den Rest CR<sup>3</sup> steht,

worin

R<sup>3</sup> für Wasserstoff oder den Rest –CO–CF<sub>3</sub> steht undR<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> gemeinsam mit dem angrenzenden Stickstoffatom und dem Rest X für einen heterocyclischen Rest der Formel

oder



stehen, worin

R<sup>4</sup> die oben angegebene Bedeutung besitzt.

## 2. Trifluormethylcarbonyl-Derivate gemäß Formel (I) in Anspruch 1, in welcher


Het für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>–C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>–C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>–C<sub>4</sub>-Alkylthio, Halogen-C<sub>1</sub>–C<sub>4</sub>-alkyl, Halogen-C<sub>1</sub>–C<sub>4</sub>-alkoxy, Halogen-C<sub>1</sub>–C<sub>4</sub>-alkylthio, Amino, C<sub>1</sub>–C<sub>4</sub>-Alkylamino oder Di-C<sub>1</sub>–C<sub>4</sub>-alkylamino substituiertes Furyl, Thiophenyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Pyrrolyl, 1,2,4-Triazolyl, 1,2,3-Triazolyl, Pyrimidinyl, Pyrazinyl, Pyridyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, 1,2,4-Oxadiazolyl, 1,3,4-Oxadiazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, 1,2,5-Thiadiazolyl und 1,3,4-Thiadiazolyl steht,

R für Wasserstoff oder Methyl steht,

$X$  für Sauerstoff, Schwefel, Stickstoff oder für die  
 Gruppierungen  $NH$  oder  $CR^4$  steht,

$Y$  für Stickstoff oder den Rest  $CR^3$  steht,

worin  
 $R^3$  für Wasserstoff oder den Rest  $CO-CF_3$  steht und  
 $R^1$  und  $R^2$  gemeinsam mit dem angrenzenden Stickstoffatom und dem Rest  $X$  für einen heterocyclischen Rest der Formel




stehen, worin  
R<sup>4</sup> für Wasserstoff oder C<sub>1</sub>–C<sub>4</sub>-Alkyl steht.

### 3. Trifluormethylcarbonyl-Derivate der Formel I gemäß Anspruch 1, in welcher

Het	für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Methyl, Ethyl, Methoxy, Methylthio, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Trifluormethylthio, Dimethylamino oder Diethylamino substituiertes Thiophenyl, Pyrazolyl, 1,2,3-Triazolyl, Pyrazinyl, Pyrimidinyl, Pyridyl, Isoxazolyl, Oxazolyl, Thiazolyl, 1,2,5-Thiadiazolyl oder 1,3,4-Thiadiazolyl steht,	40
R	für Wasserstoff steht,	
X	für Sauerstoff, Schwefel, Stickstoff oder für die Gruppierungen	45
	$\begin{array}{c} \diagup \\ \text{NH} \text{ oder } \text{---CR}^4 \text{ steht,} \\ \diagdown \end{array}$	
	worin	
	R <sup>4</sup> für Wasserstoff steht,	50
Y	für Stickstoff oder den Rest $\begin{array}{c} \diagup \\ \text{---CR}^3 \text{ steht,} \\ \diagdown \end{array}$	
	worin	
	R <sup>3</sup> für Wasserstoff oder den Rest $\text{---CO---CF}_3$ steht und	55
R <sup>1</sup> und R <sup>2</sup>	gemeinsam mit dem angrenzenden Stickstoffatom und dem Rest X für einen heterocyclischen Rest der Formel	






stehen, worin  
R<sup>4</sup> für Wasserstoff oder Alkyl steht,

dadurch gekennzeichnet,

(a) daß man zum Erhalt von Verbindungen der Formel (Ia)




in welcher

Het und R die oben angegebene Bedeutung besitzen,  
R<sup>5</sup> und R<sup>6</sup> gemeinsam für einen gegebenenfalls durch C<sub>1</sub>—C<sub>4</sub>-Alkyl substituierten C<sub>2</sub>—C<sub>3</sub>-Alkylrest  
stehen und


X<sup>1</sup> für Sauerstoff, Schwefel oder die Gruppierung  $\begin{matrix} \diagup \\ \text{NH} \\ \diagdown \end{matrix}$  steht,

Hetarylmethylamine der Formel (II)



in welcher

Het, R, R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup> und X<sup>1</sup> die oben angegebenen Bedeutungen haben,  
mit 1,1-Bismethylthio-4,4,4-trifluor-1-buten-3-on der Formel (III)




gegebenenfalls in Gegenwart von Verdünnungsmitteln umgesetzt, oder

(b) daß man zum Erhalt von Verbindungen der Formel (Ib)



15 in welcher  
 Het, R, R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup> und X<sup>1</sup> die oben angegebene Bedeutung haben,  
 Trifluormethylcarbonyl-Derivate der Formel (Ia)



30 in welcher  
 Het, R, R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup> und X<sup>1</sup> die oben angegebenen Bedeutungen haben,  
 mit einem Trifluormethylcarbonsäure-Derivat der Formel (IV)




40 in welcher  
 Q für Fluor, Chlor oder den Rest  $-\text{O}-\text{CO}-\text{CF}_3$  steht,  
 gegebenenfalls in Gegenwart eines Säureakzeptors und gegebenenfalls in Gegenwart eines Verdünnungs-  
 mittels umgesetzt, oder

(c) daß man zum Erhalt von Verbindungen der Formel (Ic)




55 in welcher  
 Het, R, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, X die oben angegebene Bedeutung besitzen und  
 Y<sup>1</sup> für die Gruppierungen



steht,  
 Verbindungen der Formel (V)

65






(I)

5

10


in welcher  
 $\text{R}^1$ ,  $\text{R}^2$  und  $\text{X}$  die oben angegebenen Bedeutungen haben und  
 $\text{Y}^1$  für die Gruppierung

15



20

steht, mit Halogeniden der Formel (VI)



(VI)


25

in welcher  
 $\text{Het}$  und  $\text{R}$  die oben angegebenen Bedeutungen haben und  
 $\text{Hal}$  für Halogen steht,  
 gegebenenfalls in Gegenwart einer starken Base und gegebenenfalls in Gegenwart eines Verdünnungsmittels umgesetzt, oder

30

(d) daß man zum Erhalt von Verbindungen der Formel (Id)

35




(Id)

40

45

in welcher  
 $\text{Het}$ ,  $\text{R}$  und  $\text{Y}^1$  die oben angegebene Bedeutung haben und  
 $\text{R}^7$  und  $\text{R}^8$  für einen gegebenenfalls durch  $\text{C}_1 - \text{C}_4$ -Alkyl substituierten  $\text{C}_2 - \text{C}_3$ -Alkyl- oder Alkyl-Rest stehen,  
 Methyl-Derivate der Formel (VII)

50



(VII)


55

60

in welcher  
 $\text{Het}$ ,  $\text{R}$ ,  $\text{R}^7$  und  $\text{R}^8$  die oben angegebenen Bedeutungen haben

( $\alpha$ ) mit der zweifachen molaren Menge Trifluormethylcarbonsäure-Derivat der Formel (IV)

65




(IV)

5

in welcher

Q die oben angegebenen Bedeutungen hat,  
gegebenenfalls in Gegenwart eines Säureakzeptors und gegebenenfalls in Gegenwart eines Verdünnungs-  
mittels zu den Trifluormethylcarbonyl-Derivaten der Formel (Id- $\alpha$ )

10

(Id- $\alpha$ )

15


20

in welcher

Het, R, R<sup>7</sup> und R<sup>8</sup> die oben angegebenen Bedeutungen haben,  
umsetzt, oder

25

(β) mit der zweifachen molaren Menge Trifluormethylcarbonsäure-Derivat der Formel (IV)




(IV)

30

in welcher

Q die oben angegebenen Bedeutungen hat,  
gegebenenfalls in Gegenwart eines Säureakzeptors und gegebenenfalls in Gegenwart eines Verdünnungs-  
mittels zu den Trifluormethylcarbonyl-Derivaten der Formel (Id-β)

35



(Id-β)

40


45

in welcher

Het, R, R<sup>7</sup> und R<sup>8</sup> die oben angegebenen Bedeutungen haben,  
umsetzt, oder

50

(e) zum Erhalt von Verbindungen der Formel (Ie)



(Ie)

55

60

in welcher

Het, R, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, X die oben angegebene Bedeutung haben,  
Salze der Formel (VIII)

65



5

in welcher  
 Het, R, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> und X die oben angegebenen Bedeutungen haben und  
 Hal<sup>1</sup> für Halogen steht,  
 mit einem Trifluormethylcarbonsäure-Derivat der Formel (IV)

10



15

in welcher  
 Q die oben angegebene Bedeutung hat,  
 gegebenenfalls in Gegenwart eines Säureakzeptors und gegebenenfalls in Gegenwart eines Verdünnungs-  
 mittels umgesetzt.

20

5. Schädlingsbekämpfungsmittel, gekennzeichnet durch einen Gehalt an mindestens einem Trifluormethyl-  
 carbonyl-Derivat der Formel (I).

6. Insektizide und ektoparasitizide Mittel, gekennzeichnet durch einen Gehalt an mindestens einem Trifluor-  
 methylcarbonyl-Derivat der Formel (I).

25

7. Verfahren zur Bekämpfung von Insekten und/oder Ektoparasiten, dadurch gekennzeichnet, daß man  
 Trifluormethylcarbonyl-Derivate der Formel (I) auf Insekten und/oder Ektoparasiten und/oder deren Le-  
 bensraum einwirken läßt.

8. Verwendung von Trifluormethylcarbonyl-Derivaten der Formel (I) zur Bekämpfung von Insekten und/  
 oder Ektoparasiten.

30

9. Verfahren zur Herstellung von Schädlingsbekämpfungsmitteln, dadurch gekennzeichnet, daß man Tri-  
 fluormethylcarbonyl-Derivate der Formel (I) mit Streckmitteln und/oder oberflächenaktiven Mitteln ver-  
 mischt.

10. 1,1-Bismethylthio-4,4,4-trifluor-1-buten-3-on der Formel

35



40

11. Trifluormethylcarbonyl-Derivate der Formel (Va)

45




50

55

in welcher

Y<sup>1</sup> für die Gruppierungen

60




steht

65

X<sup>1</sup> für Sauerstoff, Schwefel oder für die Gruppierung  $\begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ \text{NH} \end{array}$  steht und

$R^9$  und  $R^{10}$  gemeinsam mit dem angrenzenden Stickstoffatom und den Rest  $X^1$  für einen Heterocyclus der Formel



stehen, worin  
 $R^4$  für Wasserstoff oder Alkyl steht.

12. Verbindungen der Formel (VII)



in welcher

Het für gegebenenfalls einfach oder mehrfach substituiertes Hetaryl steht,  
 R für Wasserstoff oder  $C_1-C_4$ -Alkyl steht,  
 $R^7$  und  $R^8$  für einen gegebenenfalls durch  $C_1-C_4$ -Alkyl substituierten  $C_2-C_3$ -Alkylen- oder Alkylen-Rest stehen.

#### Beschreibung

40 Die vorliegende Erfindung betrifft neue hetarylalkylsubstituierte 5- und 6-Ringheterocyclen, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung in Schädlingsbekämpfungsmitteln, insbesondere als Insektizide. Darüber hinaus besitzen die neuen Verbindungen eine stark ausgeprägte ektoparasitizide Wirksamkeit.

Es ist bereits bekannt, daß bestimmte Thiazine wie z. B. Tetrahydro-2-nitromethylen-2 H-1,3-thiazin insektizide Eigenschaften aufweisen (vergl. US-PS 39 93 648).


45 Es wurden nun die neuen Trifluormethylcarbonyl-Derivate der Formel (I)



in welcher

60 Het für gegebenenfalls einfach oder mehrfach substituiertes Hetaryl steht,  
 R für Wasserstoff oder  $C_1-C_4$ -Alkyl steht,  
 X für Sauerstoff, Schwefel, Stickstoff oder für die Gruppierungen  
 65  $\text{NH}$  oder  $\text{CR}^4$  steht,  
 wobei

$R^4$  für Wasserstoff oder Alkyl steht,  
 Y für Stickstoff oder den Rest  $-CR^3$  steht, worin  
 $R^3$  für Wasserstoff oder eine Gruppierung  $-CO-CF_3$  steht und  
 $R^1$  und  $R^2$  gemeinsam mit dem angrenzenden Stickstoffatom und dem Rest X für einen heterocyclischen Rest  
 der Formel




stehen, worin  
 $R^4$  die oben angegebene Bedeutung hat,

gefunden.

Weiterhin wurde gefunden, daß man die neuen Trifluormethylcarbonyl-Derivate der Formel (I) erhält, wenn man

(a) zur Darstellung von Verbindungen der Formel




in welcher

Het und R die oben angegebenen Bedeutungen besitzen,  
 $R^5$  und  $R^6$  gemeinsam für einen gegebenenfalls durch  $C_1-C_4$ -Alkyl substituierten  $C_2-C_3$ -Alkylen-Rest stehen  
 und

$X^1$  für Sauerstoff, Schwefel oder die Gruppierung  $-NH$  steht,

Hetarylmethylamine der Formel (II)




in welcher

Het, R,  $R^5$ ,  $R^6$  und  $X^1$  die oben angegebene Bedeutung haben,  
 mit 1,1-Bismethylthio-4,4,4-trifluor-1-buten-3-on der Formel (III)



gegebenenfalls in Gegenwart von Verdünnungsmitteln umgesetzt, oder

(b) zum Erhalt von Verbindungen der Formel (Ib)



in welcher  
 Het, R, R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup> und X<sup>1</sup> die oben angegebene Bedeutung haben,  
 Trifluormethylcarbonyl-Derivate der Formel (Ia)



in welcher  
 Het, R, R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup> und X<sup>1</sup> die oben angegebene Bedeutung haben,  
 mit einem Trifluormethylcarbonsäure-Derivat der Formel (IV)



in welcher  
 Q für Fluor, Chlor oder den Rest  $-\text{O}-\text{CO}-\text{CF}_3$  steht,  
 gegebenenfalls in Gegenwart eines Säureakzeptors und gegebenenfalls in Gegenwart eines Verdünnungsmittels  
 umgesetzt, oder


(c) zum Erhalt von Verbindungen der Formel (Ic)



in welcher  
 Het, R, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, X die oben angegebene Bedeutung besitzen und

Y<sup>1</sup> für die Gruppierungen  $\diagup \text{CH} \diagdown$  oder  $\diagup \text{C}-\text{CO}-\text{CF}_3 \diagdown$  steht,

Verbindungen der Formel (V)




(V)

in welcher  
 $\text{R}^1$ ,  $\text{R}^2$  und X die oben angegebenen Bedeutungen haben und

$\text{Y}^1$  für die Gruppierungen  $\text{CH}$  oder  $\text{C}-\text{CO}-\text{CF}_3$


mit Halogeniden der Formel (VI)



(VI)


in welcher  
 Het und R die oben angegebenen Bedeutungen haben und  
 Hal für Halogen steht,  
 gegebenenfalls in Gegenwart einer starken Base und gegebenenfalls in Gegenwart eines Verdünnungsmittels  
 umsetzt, oder

(d) zum Erhalt von Verbindungen der Formel (Id)



(Id)


in welcher  
 Het, R und  $\text{Y}^1$  die oben angegebene Bedeutung haben und  
 $\text{R}^7$  und  $\text{R}^8$  für einen gegebenenfalls durch  $\text{C}_1-\text{C}_4$ -Alkyl substituierten  $\text{C}_2-\text{C}_3$ -Alkylen- oder Alkenylen-Rest  
 stehen,  
 Methyl-Derivate der Formel (VII)



(VII)

in welcher  
 Het, R,  $\text{R}^7$  und  $\text{R}^8$  die oben angegebenen Bedeutungen haben,

 $\alpha$  mit der zweifachen molaren Menge Trifluormethylcarbonsäure-Derivat der Formel (IV)



(IV)

- 5 in welcher  
Q die oben angegebenen Bedeutungen hat,  
gegebenenfalls in Gegenwart eines Säureakzeptors und gegebenenfalls in Gegenwart eines Verdünnungsmittels  
zu den Trifluormethylcarbonyl-Derivaten der Formel (Id- $\alpha$ )



in welcher  
Het, R, R<sup>7</sup> und R<sup>8</sup> die oben angegebenen Bedeutungen haben,  
umsetzt, oder

- 25  $\beta$  mit der dreifachen molaren Menge Trifluormethylcarbonsäure-Derivat der Formel (IV)



- in welcher  
Q die oben angegebenen Bedeutungen hat,  
gegebenenfalls in Gegenwart eines Säureakzeptors und gegebenenfalls in Gegenwart eines Verdünnungsmittels  
zu den Trifluormethylcarbonyl-Derivaten der Formel (Id- $\beta$ )




- in welcher  
Het, R, R<sup>7</sup> und R<sup>8</sup> die oben angegebenen Bedeutungen haben,  
umsetzt, oder

(e) zum Erhalt von Verbindungen der Formel (Ie)



- in welcher  
Het, R, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, X die oben angegebene Bedeutung haben  
Salze der Formel (VIII)






(VIII)

5

in welcher  
 Het, R, R<sup>7</sup> und R<sup>8</sup> die oben angegebenen Bedeutungen haben und  
 Hal<sup>1</sup> für Halogen steht,  
 mit einem Trifluormethylcarbonsäure-Derivat der Formel (IV)

10



(IV)

15

in welcher  
 Q die oben angegebene Bedeutung hat,  
 gegebenenfalls in Gegenwart eines Säureakzeptors und gegebenenfalls in Gegenwart eines Verdünnungsmittels  
 umgesetzt.

20

Überraschenderweise zeichnen sich die erfindungsgemäßen Trifluormethylcarbonyl-Derivate der Formel (I),  
 in überragender Weise durch eine hohe Wirksamkeit als Insektizide und Ektoparasitizide aus.

Die Erfindung betrifft vorzugsweise Verbindungen der Formel (I), in welcher

25

Het für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>–C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>–C<sub>4</sub>-Alkoxy,  
 C<sub>1</sub>–C<sub>4</sub>-Alkylthio, Halogen-C<sub>1</sub>–C<sub>4</sub>-alkyl, Halogen-C<sub>1</sub>–C<sub>4</sub>-alkoxy, Halogen-C<sub>1</sub>–C<sub>4</sub>-alkylthio, Ami-  
 no, C<sub>1</sub>–C<sub>4</sub>-Alkylamino oder Di-C<sub>1</sub>–C<sub>4</sub>-alkylamino substituiertes Furyl, Thiophenyl, Pyrazolyl, Imi-  
 dazolyl, Pyrrolyl, 1,2,4-Triazolyl, 1,2,3-Triazolyl, Pyrimidinyl, Pyrazinyl, Pyridyl, Oxazolyl, Isoxazolyl,  
 1,2,4-Oxadiazolyl, 1,3,4-Oxadiazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, 1,2,5-Thiadiazolyl und 1,3,4-Thiadiazolyl  
 steht,

30

R für Wasserstoff oder Methyl steht,





X für Sauerstoff, Schwefel, Stickstoff oder für die Gruppierungen  $\text{NH}$  oder  $\text{CR}^4$  steht,

35





Y für Stickstoff oder den Rest  $\text{CR}^3$  steht, worin

R<sup>3</sup> für Wasserstoff oder eine Gruppierung  $-\text{CO}-\text{CF}_3$  steht und  
 R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> gemeinsam mit dem angrenzenden Stickstoffatom und dem Rest X für einen heterocyclischen Rest  
 der Formel


40




45



50



oder



55

60

stehen, worin  
 R<sup>4</sup> für Wasserstoff oder C<sub>1</sub>–C<sub>4</sub>-Alkyl steht.

65

Besonders bevorzugt sind diejenigen Verbindungen der Formel (I), in welcher


Het für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Methyl, Ethyl, Methoxy, Methylthio, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Trifluormethylthio, Dimethylamino oder Diethylamino substituiertes Thiophenyl, Pyrazolyl, 1,2,3-Triazolyl, Pyrazinyl, Pyrimidinyl, Pyridyl, Isoxazolyl, Oxazolyl, Thiazolyl, 1,2,5-Thiadiazolyl oder 1,3,4-Thiadiazolyl steht,

5 R für Wasserstoff steht,  
X für Sauerstoff, Schwefel, Stickstoff oder für die Gruppierungen

$\diagup$   
—NH oder —CR<sup>4</sup> steht,


10  
Y für Stickstoff oder den Rest  $-\text{CR}^3$  steht, worin

15  $R^1$  und  $R^2$   $R^3$  für Wasserstoff oder eine Gruppierung  $-\text{CO}-\text{CF}_3$  steht und  
gemeinsam mit dem angrenzenden Stickstoffatom und dem Rest X für einen heterocyclischen Rest  
der Formel





stehen, worin  
R<sup>4</sup> für Wasserstoff steht.


35 Verwendet man beispielsweise für das erfindungsgemäße Verfahren (a) 1,1-Bismethylthio-4,4,4-trifluor-1-buten-3-on und N-(3-Pyridyl-methyl)-N-(aminoethyl)-amin als Ausgangsstoffe, so kann die Reaktion durch das folgende Formelschema wiedergegeben werden:




Verwendet man beispielsweise für das erfindungsgemäße Verfahren (b) 3-(6-Chlor-pyrid-3-yl)-methyl-2-(tri-  
60 fluormethylcarbonyl-vinyl)-1.3-thiazolidin und Trifluoressigsäureanhydrid als Ausgangsstoffe, so kann die Reaktion durch das folgende Formelschema wiedergegeben werden:



Verwendet man beispielsweise für das erfindungsgemäße Verfahren (c) 2-(Trifluormethylcarbonyl-vinyl)-1,3-thiazolidin und 2-Chlor-5-chlormethyl-pyridin als Ausgangsstoffe, so kann die Reaktion durch das folgende Formelschema wiedergegeben werden:



Verwendet man beispielsweise für das erfindungsgemäße Verfahren (d) als Ausgangsstoffe 1-(2-Chlor-pyrid-5-yl)-methyl-2-methyl-2-imidazolin und für die Verfahrensvariante (d/α) die zweifache molare Menge Trifluoressigsäureanhydrid bzw. für die Verfahrensvariante (d/β) die dreifache molare Menge Trifluoressigsäureanhydrid, so können die Reaktionen durch die folgenden Formelschemata wiedergegeben werden:



Die beim erfindungsgemäßen Verfahren (a) als Ausgangsstoffe zu verwendenden Hetarylmethylamine sind durch die Formel (II) allgemein definiert. In dieser Formel (II) stehen Het und R vorzugsweise für diejenigen Reste, die bereits im Zusammenhang mit der Beschreibung der erfindungsgemäßen Stoffe der Formel (I) vorzugsweise für diese Substituenten genannt wurden. R<sup>5</sup> und R<sup>6</sup> stehen in dieser Formel gemeinsam für einen gegebenenfalls durch C<sub>1</sub>—C<sub>4</sub>-Alkyl substituierten C<sub>2</sub>—C<sub>3</sub>-Alkylen-Rest, vorzugsweise für einen gegebenenfalls durch Methyl substituierten C<sub>2</sub>—C<sub>3</sub>-Alkylen-Rest. X<sup>1</sup> steht in dieser Formel (II) für Sauerstoff, Schwefel oder die















Gruppierung NH.














Die Verbindungen der Formel (II) sind bekannt und/oder lassen sich nach bekannten Methoden herstellen (vgl. z. B. EP-A 1 54 178, EP-A 1 63 855 und EP-A 1 92 060). Als Beispiele für die Hetarylmethylamine der Formel (II) seien genannt:























(III)

Tabelle 1












Het	R	$  \begin{array}{c}  \text{R}^5 \quad \text{R}^6 \\    \quad   \\  -\text{NH}-\text{X}'\text{H}  \end{array}  $
	H	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{NH}_2$
	H	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{NH}_2$
	CH <sub>3</sub>	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{NH}_2$
	H	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SH}$
	H	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SH}$
	H	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{OH}$
	H	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{OH}$
	H	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{NH}_2$
	H	$-\text{NH}-\text{CH}_2-\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CH}}}-\text{NH}_2$
	H	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{NH}_2$
	CH <sub>3</sub>	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{NH}_2$
	H	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SH}$
	H	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SH}$
	H	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{OH}$











Het	R	$\begin{array}{c} \text{R}^5 \quad \text{R}^6 \\   \quad   \\ \text{—NH—} \quad \text{X}^1\text{H} \end{array}$
	H	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —OH
	CH <sub>3</sub>	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —NH <sub>2</sub>
	H	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —SH
	H	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —NH <sub>2</sub>
	H	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —NH <sub>2</sub>
	H	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —NH <sub>2</sub>
	H	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —NH <sub>2</sub>
	H	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —NH <sub>2</sub>
	H	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —OH
	H	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —OH
	H	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —SH
	H	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —SH
	H	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —NH <sub>2</sub>

Het	R	$  \begin{array}{c}  \text{R}^5 \quad \text{R}^6 \\    \quad   \\  -\text{NH} \quad \text{X}^1\text{H}  \end{array}  $
	H	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{NH}_2$
	H	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{OH}$
	H	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{OH}$
	H	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SH}$
	H	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SH}$
	H	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{NH}_2$
	H	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{NH}_2$
	H	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{OH}$
	H	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{OH}$
	H	$-\text{NH}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{SH}$

Het	R	$\begin{array}{c} \text{R}^3 \quad \text{R}^6 \\   \quad   \\ \text{—NH—} \quad \text{X'H} \end{array}$
	H	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —SH
	H	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —NH <sub>2</sub>
	H	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —NH <sub>2</sub>
	H	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —OH
	H	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —OH
	H	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —SH
	H	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —SH
	H	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —NH <sub>2</sub>
	H	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —NH <sub>2</sub>
	H	—NH—CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> —OH



Het	R	$\begin{array}{c} \text{R}^5 \quad \text{R}^6 \\   \quad   \\ \text{—NH—} \quad \text{X}^1\text{H} \end{array}$
	H	$\text{—NH—CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{—OH}$
	H	$\text{—NH—CH}_2\text{CH}_2\text{—SH}$
	H	$\text{—NH—CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{—SH}$
	H	$\text{—NH—CH}_2\text{CH}_2\text{—NH}_2$
	H	$\text{—NH—CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{—NH}_2$
	H	$\text{—NH—CH}_2\text{CH}_2\text{—OH}$
	H	$\text{—NH—CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{—OH}$
	H	$\text{—NH—CH}_2\text{CH}_2\text{—SH}$
	H	$\text{—NH—CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{—SH}$
	H	$\text{—NH—CH}_2\text{CH}_2\text{—NH}_2$
	H	$\text{—NH—CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{—NH}_2$

Het	R	$  \begin{array}{c}  \text{R}^5 \quad \text{R}^6 \\    \quad   \\  \text{---NH} \quad \text{X}^1\text{H}  \end{array}  $
	H	$\text{---NH---CH}_2\text{CH}_2\text{---OH}$
	H	$\text{---NH---CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{---OH}$
	H	$\text{---NH---CH}_2\text{CH}_2\text{---SH}$
	H	$\text{---NH---CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{---SH}$
	H	$\text{---NH---CH}_2\text{CH}_2\text{---NH}_2$
	H	$\text{---NH---CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{---NH}_2$
	H	$\text{---NH---CH}_2\text{CH}_2\text{---OH}$
	H	$\text{---NH---CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{---OH}$
	H	$\text{---NH---CH}_2\text{CH}_2\text{---SH}$
	H	$\text{---NH---CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{---SH}$

Die weiterhin als Ausgangsstoff für das erfindungsgemäße Verfahren (a) zu verwendende Verbindung 1,1-Bis-methylthio-4,4,4-trifluor-1-buten-3-on der Formel (III) ist neu und Teil der vorliegenden Erfindung. Sie läßt sich auf einfache Weise herstellen, indem man 1,1,1-Trifluoraceton in Gegenwart von starken Basen, wie z. B. Natriumhydrid und in Gegenwart von inerten Lösungsmitteln wie z. B. Tetrahydrofuran, Dimethylformamid oder Dimethylsulfoxid mit Schwefelkohlenstoff und einem Methylierungsmittel wie z. B. Methyljodid bei Temperaturen zwischen 0°C und 60°C umsetzt. Die Aufarbeitung des Reaktionsproduktes geschieht nach üblichen Methoden.

Das erfindungsgemäße Verfahren (a) zur Herstellung der neuen Trifluormethylcarbonyl-Derivate der Formel (I) wird vorzugsweise unter Verwendung von Verdünnungsmitteln durchgeführt. Als Verdünnungsmittel kommen dabei praktisch alle inerten organischen Lösungsmittel in Frage. Hierzu gehören vorzugsweise aliphatische und aromatische, gegebenenfalls halogenierte Kohlenwasserstoffe wie Pentan, Hexan, Heptan, Cyclohexan, Petrolether, Benzin, Ligroin, Benzol, Toluol, Xylol, Methylenchlorid, Ethylenchlorid, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Chlorbenzol und o-Dichlorbenzol, Ether wie Diethyl- und Dibutylether, Glykoldimethylether und Diglykoldimethylether, Tetrahydrofuran und Dioxan, Alkohole wie Methanol, Ethanol, n-Propanol, i-Propanol und n-Butanol, Nitrile wie z. B. Acetonitril und Propionitril, Amide wie z. B. Dimethylformamid, Dimethylacetamid und N-Methyl-pyrrolidon sowie Dimethylsulfoxid, Tetramethylsulfon und Hexamethylphosphorsäure-triamid.

Die Reaktionstemperaturen können bei dem erfindungsgemäßen Verfahren (a) in einem größeren Bereich variiert werden. Im allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen zwischen 0°C und 180°C, vorzugsweise bei Temperaturen zwischen 20°C und 160°C. Das erfindungsgemäße Verfahren (a) wird im allgemeinen unter Normaldruck durchgeführt.

Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens (a) werden die jeweils benötigten Ausgangsstoffe im allgemeinen in angenähert äquimolaren Mengen eingesetzt. Die Reaktionen werden im allgemeinen in einem geeigneten Verdünnungsmittel durchgeführt, und das Reaktionsgemisch wird mehrere Stunden bei der jeweils erforderlichen Temperatur gerührt. Die Aufarbeitung erfolgt bei dem erfindungsgemäßen Verfahren (a) jeweils nach üblichen Methoden.

Die beim erfindungsgemäßen Verfahren (b) als Ausgangsstoffe zu verwendenden Trifluormethylcarbonyl-Derivate sind durch die Formel (Ia) allgemein definiert. In dieser Formel (Ia) stehen Het, R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> vorzugsweise für diejenigen Reste, die bereits im Zusammenhang mit der Beschreibung der erfindungsgemäßen Stoffe der Formel (I) vorzugsweise für diese Substituenten genannt wurden. X<sup>1</sup> steht in dieser Formel für Sauerstoff, Schwefel oder

die Gruppierung  $\text{NH}$ .

Die Verbindungen der Formel (Ia) sind erfindungsgemäße Verbindungen und lassen sich nach den erfindungsgemäßen Verfahren (a), (c) und (d/α) herstellen.

Als Beispiele für die Verbindungen der Formel (Ia) seien genannt:































R=H, CH<sub>3</sub>






























Tabelle 2

Het	$  \begin{array}{c}  \text{R}^5 \quad \text{R}^6 \\    \quad   \\  -\text{N}-\text{X}^1 \\  \backslash \\  \text{C}  \end{array}  $	Het	$  \begin{array}{c}  \text{R}^5 \quad \text{R}^6 \\    \quad   \\  -\text{N}-\text{X}^1 \\  \backslash \\  \text{C}  \end{array}  $
			
			
			
			
			
			
			

Het



Het



Die bei dem erfindungsgemäßen Verfahren (b) außerdem als Ausgangsstoffe zu verwendenden Trifluormethylcarbonyl-carbonsäure-Derivate sind durch die Formel (IV) allgemein definiert. In dieser Formel (IV) steht Q für Fluor, Chlor oder den Rest  $-\text{O}-\text{CO}-\text{CF}_3$ . Vorzugsweise steht Q für  $-\text{O}-\text{CO}-\text{CF}_3$ .

Als Beispiele für die Verbindungen der Formel (IV) seien genannt:

5 1,1,1-Trifluoressigsäure-anhydrid, -fluorid und -chlorid.


Das erfindungsgemäße Verfahren (b) zur Herstellung der neuen Verbindungen der Formel (I) wird vorzugsweise unter Verwendung von Verdünnungsmitteln durchgeführt. Als Verdünnungsmittel kommen dabei praktisch alle inerten organischen Lösungsmittel in Frage. Hierzu gehören vorzugsweise aliphatische und aromatische, gegebenenfalls halogenierte Kohlenwasserstoffe wie Pentan, Hexan, Heptan, Cyclohexan, Petrolether, Benzin, Ligroin, Benzol, Toluol, Xylol, Methylenchlorid, Ethylenchlorid, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Chlorbenzol und o-Dichlorbenzol, Nitril wie z. B. Acetonitril und Propionitril.

Als Säureakzeptoren können bei dem erfindungsgemäßen Verfahren alle üblicherweise für derartige Umsetzungen verwendbaren Säurebindemittel eingesetzt werden. Vorzugsweise in Frage kommen Alkalihydrogencarbonate wie z. B. Natrium- und Kaliumhydrogencarbonat, Alkalicarbonat und Erdalkalicarbonat wie Natrium-, Kalium- und Calciumcarbonat, ferner aliphatische, aromatische oder heterocyclische Amine, beispielsweise Triethylamin, Trimethylamin, Dimethylanilin, Dimethylbenzylamin, Pyridin, 1,5-Diazabicyclo-[4,3,0]-non-5-en (DBN), 1,8-Diazabicyclo-[5,4,0]-undec-7-en (DBU) und 1,4-Diazabicyclo-[2,2,2]-octan (DABCO).

Die Reaktionstemperaturen können bei dem erfindungsgemäßen Verfahren (b) in einem größeren Bereich variiert werden. Im allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen zwischen  $0^\circ\text{C}$  und  $60^\circ\text{C}$ , vorzugsweise bei Temperaturen zwischen  $0^\circ\text{C}$  und  $40^\circ\text{C}$ . Das erfindungsgemäße Verfahren (b) wird im allgemeinen unter Normaldruck durchgeführt.

Bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens (b) setzt man auf 1 Mol der Formel (Ia) 2 bis 3, vorzugsweise 2 bis 2,2 Mol Trifluormethylcarbonyl-carbonsäure-Derivat der Formel (IV) ein. Die Reaktionen werden im allgemeinen in einen geeigneten Verdünnungsmittel und in Gegenwart eines Säureakzeptors durchgeführt und das Reaktionsgemisch wird mehrere Stunden bei der jeweils erforderlichen Temperatur gerührt. Die Aufarbeitung geschieht nach üblichen Methoden.

Die beim erfindungsgemäßen Verfahren (c) als Ausgangsstoffe zu verwendenden Verbindungen sind durch die Formel (V) allgemein definiert. In dieser Formel (V) stehen  $\text{R}^1$ ,  $\text{R}^2$  und X vorzugsweise für diejenigen Reste, die bereits im Zusammenhang mit der Beschreibung der erfindungsgemäßen Stoffe der Formel (I) vorzugsweise für diese Substituenten genannt wurden.  $\text{Y}^1$  steht in dieser Formel für die Gruppierungen



35 Als Beispiele für die Verbindungen der Formel (V) seien genannt:

40


45

50

55

60

65





(V)

5


10

Tabelle 3


Y<sup>1</sup>Y<sup>1</sup>

15

20




CH




CH

25


C—COCF<sub>3</sub>

CH

30



CH



CH

35



CH



CH

40


C—COCF<sub>3</sub>

CH

45

50

Die Verbindungen der Formel (V) sind zum Teil bekannt (vgl. US-PS 45 51 447). Neu und Teil der vorliegenden Erfindung sind die Verbindungen der Formel (Va)



(Va)


55

60

65

in welcher


Y<sup>1</sup> für die Gruppierungen



steht,

X für Sauerstoff, Schwefel oder für die Gruppierung  $\begin{array}{c} \diagup \\ \text{---NH} \\ \diagdown \end{array}$  steht und

10 R<sup>9</sup> und R<sup>10</sup> gemeinsam mit dem angrenzenden Stickstoffatom und den Rest X<sup>1</sup> für einen Heterocyclus der Formel



stehen,  
worin

30 R<sup>4</sup> für Wasserstoff oder Alkyl steht.

Die neuen Verbindungen der Formel (Va) lassen sich nach bekannten Methoden herstellen, z. B. indem man Verbindungen der Formel (IX)



in welcher  
R<sup>9</sup>, R<sup>10</sup> und X<sup>1</sup> die oben angegebenen Bedeutungen haben,  
45 mit Trifluormethylcarbonsäure-Derivaten der Formel (IV)



in welcher

Q die oben angegebenen Bedeutungen hat,

in Gegenwart von Säureakzeptoren, wie z. B. Triethylamin oder Pyridin und in Gegenwart von inerten Lösungsmitteln, wie z. B. Dichlormethan oder Acetonitril bei Temperaturen zwischen -10°C und +40°C umgesetzt.


55 Die für die Herstellung von den Verbindungen der Formel (Va) zu verwendenden Ausgangsprodukte der Formel (IX) sind bekannte Verbindungen der organischen Chemie (vgl. z. B. J. Org. Chem. 40, 252 (1975)).

Die beim erfindungsgemäßen Verfahren (c) außerdem als Ausgangsstoffe zu verwendenden Halogenide sind durch die Formel (VI) allgemein definiert. In dieser Formel (VI) stehen Het und R vorzugsweise für diejenigen Reste, die bereits im Zusammenhang mit der Beschreibung der erfindungsgemäßen Stoffe der Formel (I) vorzugsweise für diese Substituenten genannt wurden. Hal steht in dieser Formel für Halogen, vorzugsweise für Chlor oder Brom.

60 Die Verbindungen der Formel (VI) sind bekannt oder lassen sich nach bekannten Verfahren herstellen (vgl. z. B. EP-A 1 92 060; EP-A 1 63 855; EP-A 1 54 178; J. Org. Chem. 34, 3547; J. Med. Chem. 14, 211-213 und 557-558 (1971); US-PS 43 32 944 und J. Het. Chem. 1979, 333-337).

65 Als Beispiele für die Verbindungen der Formel (VI) seien genannt:


















Hal = Cl oder Br.

(VI)

5

Tabelle 4

Het	R	Het	R
	H		H
	H		H
	H		H
	H		H
	H		H
	H		H
	H		

10

15

20

25

30

35

40

45

Das erfindungsgemäße Verfahren (c) zur Herstellung der neuen Verbindungen der Formel (I) wird vorzugsweise unter Verwendung von Verdünnungsmitteln durchgeführt. Als Verdünnungsmittel kommen dabei praktisch alle inerten organischen Lösungsmittel in Frage. Hierzu gehören vorzugsweise Ether wie Diethyl- und Dibutylether, Glykoldimethylether und Diglykoldimethylether, Tetrahydrofuran und Dioxan, Nitrile wie z. B. Acetonitril und Propionitril, Amide wie z. B. Dimethylformamid, Dimethylacetamid und N-Methyl-pyrrolidon sowie Dimethylsulfoxid, Tetramethylsulfon und Hexamethylphosphorsäuretriamid.

50

Als Säureakzeptoren können bei dem erfindungsgemäßen Verfahren (c) alle üblicherweise für derartige Umsetzungen verwendbaren Säurebindemittel eingesetzt werden. Vorzugsweise in Frage kommen Alkalimetallhydride wie z. B. Natrium- und Kaliumhydrid, Alkalicarbonat und -alkoholate wie Natrium- und Kaliumcarbonat, Natrium- und Kaliummetholat bzw. -ethylat, ferner aliphatische, aromatische oder heterocyclische Amine, beispielsweise Triethylamin, Triethylamin, Dimethylanilin, Dimethylbenzylamin, Pyridin, 1,5-Diazabicyclo-[4,3,0]-non-5-en (DBN), 1,8-Diazabicyclo-[5,4,0]-undec-7-en (DBU) und 1,4-Diazabicyclo-[2,2,2]-octan (DABCO).

55

Die Reaktionstemperaturen können bei dem erfindungsgemäßen Verfahren (c) in einem größeren Bereich variiert werden. Im allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen zwischen 0°C und 160°C, vorzugsweise bei Temperaturen zwischen 20°C und 120°C. Das erfindungsgemäße Verfahren (c) wird im allgemeinen unter Normaldruck durchgeführt.


60

Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens (c) werden die jeweils benötigten Ausgangsstoffe und der Säureakzeptor im allgemeinen in angenähert äquimolaren Mengen eingesetzt. Die Reaktionen werden im allgemeinen in einem geeigneten Verdünnungsmittel in Gegenwart eines Säureakzeptors durchgeführt, und das Reaktionsgemisch wird mehrere Stunden bei der jeweils erforderlichen Temperatur gerührt. Die Aufarbeitung erfolgt bei dem erfindungsgemäßen Verfahren (c) jeweils nach üblichen Methoden.

65


















Die beim erfindungsgemäßen Verfahren (d) als Ausgangsstoffe zu verwendenden Methyl-Derivate sind durch die Formel (VII) allgemein definiert. In dieser Formel (VII) stehen Het und R vorzugsweise für diejenigen Reste, die bereits im Zusammenhang mit der Beschreibung der erfindungsgemäßen Stoffe der Formel (I) vorzugsweise für diese Substituenten genannt wurden. R<sup>7</sup> und R<sup>8</sup> stehen in dieser Formel gemeinsam für einen gegebenenfalls durch C<sub>1</sub>—C<sub>4</sub>-Alkyl substituierten C<sub>2</sub>—C<sub>3</sub>-Alkylen- oder Alkenylen-Rest, vorzugsweise für einen gegebenenfalls durch Methyl substituierten C<sub>2</sub>—C<sub>3</sub>-Alkylen- oder Alkenylen-Rest stehen.

Als Beispiele für die Methyl-Derivate der Formel (VII) seien genannt:



(VII)


Tabelle 5

Het	R	
	H	
	H	
	H	
	H	
	H	
	H	
	H	
	H	


5

Het


R




10




H




15




H




20




H



25



H




30

35

Die Verbindungen der Formel (VII) sind neu und Teil der vorliegenden Erfindung. Sie lassen sich auf einfache Weise herstellen, indem man Hetarylmethylamine der Formel (IIa)

40




(IIa)

45

in welcher  
Het, R, R<sup>7</sup> und R<sup>8</sup> die oben angegebenen Bedeutungen haben  
mit Orthoessigsäureestern der Formel (X)

50




(X)

55

in welcher  
R<sup>11</sup> für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl steht,  
gegebenenfalls in Gegenwart von Katalysatoren, wie z. B. p-Toluolsulfonsäure und gegebenenfalls in Gegen-  
wart von inerten Verdünnungsmitteln wie z. B. Xylol oder Toluol bei Temperaturen zwischen 20°C und 160°C  
umsetzt.

60

Die Verbindungen der Formel (IIa) wurden bereits bei der Beschreibung der Verbindungen der Formel (II)



65

Die Orthoessigsäureester der Formel (X) sind bekannte Verbindungen der organischen Chemie.

Als Beispiele für die Verbindungen der Formel (X) seien beispielsweise genannt:

Orthoessigsäure-trimethylester, -triethylester und -tri-n-propylester.

Die weiterhin als Ausgangsstoffe für das erfindungsgemäße Verfahren (d, Variante  $\alpha$  und Variante  $\beta$ ) zu  
verwendenden Trifluormethylcarbonyl-Derivate der Formel (IV) wurden bereits bei der Beschreibung des

Verfahrens (b) beschrieben.

Für die Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens (d/Variante  $\alpha$  und  $\beta$ ) kommen diejenigen Verdünnungsmittel und Säureakzeptoren in Frage, die bereits bei der Beschreibung des erfindungsgemäßen Verfahrens (b) angegeben wurden.


Die Reaktionstemperaturen können bei dem erfindungsgemäßen Verfahren (d) für beide Varianten ( $\alpha$ ) und ( $\beta$ ) in einem größeren Bereich variiert werden. Im allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen zwischen 0° und 60° C, vorzugsweise bei Temperaturen zwischen 0° C und 40° C. Das erfindungsgemäße Verfahren (d/ $\alpha$  und d/ $\beta$ ) wird im allgemeinen unter Normaldruck durchgeführt.

Bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens (d) setzt man auf 1 Mol der Verbindung der Formel (VII), gemäß Variante (d/ $\alpha$ ) 2 Mol der Verbindung der Formel (IV), für den Fall, daß Verbindungen der Formel (Id- $\alpha$ ) hergestellt werden sollen. Für den Fall, daß Verbindungen der Formel (Id- $\beta$ ) hergestellt werden sollen, setzt man gemäß Variante (d/ $\beta$ ) 3 Mol der Verbindung der Formel (IV) auf 1 Mol der Verbindung der Formel (VII) ein. Die Aufarbeitung der Reaktionsprodukte geschieht nach üblichen Methoden.

Die beim erfindungsgemäßen Verfahren (e) als Ausgangsstoffe zu verwendenden Salze sind durch die Formel (VIII) allgemein definiert. In dieser Formel (VIII) stehen Het, R, R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> vorzugsweise für diejenigen Reste, die bereits im Zusammenhang mit der Beschreibung der erfindungsgemäßen Stoffe der Formel (I) vorzugsweise für diese Substituenten genannt wurden. Hal<sup>1</sup> steht in dieser Formel für Halogen, vorzugsweise für Chlor oder Brom.

Die Verbindungen der Formel (VIII) sind bekannt und/oder lassen sich nach bekannten Methoden herstellen (vgl. CA. 61, 652 a-e; Chem. Berichte 54, 814 (1921) und 88, 1103 (1955) und J. Chem. Soc. 1939, 1855 und Herstellungsbeispiele).

Als Beispiele für die Salze der Formel (VIII) seien genannt:













































(VIII)


Hal = Cl oder Br

R = H oder CH<sub>3</sub>




































Tabelle 6

Het		Het	
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			


Het




Het







5 Het





Het



10



15



20

Die weiterhin als Ausgangsstoffe für das erfindungsgemäße Verfahren (e) zu verwendende Trifluormethylcarbonyl-Derivate der Formel (IV) wurden bereits bei der Beschreibung des Verfahrens (b) beschrieben.

Das erfindungsgemäße Verfahren (e) zur Herstellung der neuen Verbindungen der Formel (I) wird vorzugsweise unter Verwendung von Verdünnungsmittel durchgeführt. Als Verdünnungsmittel kommen dabei praktisch alle inerten organischen Lösungsmittel in Frage. Hierzu gehören vorzugsweise aliphatische und aromatische, gegebenenfalls halogenierte Kohlenwasserstoffe wie Pentan, Hexan, Heptan, Cyclohexan, Petrolether, Benzin, Ligroin, Benzol, Toluol, Xylol, Methylenchlorid, Ethylenchlorid, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Chlorbenzol und o-Dichlorbenzol und Nitrile wie z. B. Acetonitril und Propionitril.

Als Säureakzeptoren können bei dem erfindungsgemäßen Verfahren (e) alle üblicherweise für derartige Umsetzungen verwendbaren Säurebindemittel eingesetzt werden. Vorzugsweise in Frage kommen Alkalimetallhydroxide wie z. B. Natrium- und Kaliumhydroxid, Erdalkalihydroxide wie z. B. Calciumhydroxid, Alkalicarbonat und -alkoholate wie Natrium- und Kaliumcarbonat, Natrium- und Kaliummethylat bzw. -ethylat, ferner aliphatische, aromatische oder heterocyclische Amine, beispielsweise Triethylamin, Trimethylamin, Dimethylanilin, Dimethylbenzylamin, Pyridin, 1,5-Diazabicyclo-[4,3,0]-non-5-en (DBN), 1,8-Diabicyclo-[5,4,0]-undec-7-en (DBU) und 1,4-Diazabicyclo-[2,2,2]-octan (DABCO).

Die Reaktionstemperaturen können bei dem erfindungsgemäßen Verfahren (e) in einem größeren Bereich variiert werden. Im allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen zwischen 0°C und 100°C, vorzugsweise bei Temperaturen zwischen 20°C und 80°C.

Das erfindungsgemäße Verfahren (e) wird im allgemeinen unter Normaldruck durchgeführt. Es ist jedoch auch möglich, unter erhöhtem oder vermindertem Druck zu arbeiten.

Bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens (e) setzt man auf 1 Mol der Verbindung der Formel (VIII) 1 Mol bis 1,5 Mol, vorzugsweise 1 Mol bis 1,2 Mol der Verbindung der Formel (IV) ein. Die Aufarbeitung der Reaktionsprodukte geschieht nach üblichen Methoden.

Die Wirkstoffe eignen sich bei guter Pflanzenverträglichkeit und günstiger Warmblüttoxizität zur Bekämpfung von tierischen Schädlingen, insbesondere Insekten, die in der Landwirtschaft, in Forsten, im Vorrats- und Materialschutz sowie auf dem Hygienesektor vorkommen. Sie sind gegen normal sensible und resistente Arten sowie gegen alle oder einzelne Entwicklungsstadien wirksam. Zu den oben erwähnten Schädlingen gehören.

Aus der Ordnung der Isopoda z. B. Oniscus asellus, Armadillidium vulgare, Porcellio scaber.

Aus der Ordnung der Diplopoda z. B. Blaniulus guttulatus.

50 Aus der Ordnung der Chilopoda z. B. Geophilus carpophagus, Scutigera spec.

Aus der Ordnung der Symphyla z. B. Scutigera immaculata.

Aus der Ordnung der Thysanura z. B. Lepisma saccharina.

Aus der Ordnung der Collembola z. B. Onychiurus armatus.

Aus der Ordnung der Orthoptera z. B. Blatta orientalis,

55 Periplaneta americana, Leucophaea maderae, Blattella germanica, Acheta domesticus, Gryllotalpa spp., Locusta migratoria migratorioides, Melanoplus differentialis, Schistocerca gregaria.

Aus der Ordnung der Dermaptera z. B. Forficula auricularia.

Aus der Ordnung der Isoptera z. B. Reticulitermes spp.

60 Aus der Ordnung der Anoplura z. B. Phylloxera vastatrix, Pemphigus spp., Pediculus humanus corporis, Haematopinus spp., Linognathus spp.

Aus der Ordnung der Mallophaga z. B. Trichodectes spp., Damalinae spp.

Aus der Ordnung der Thysanoptera z. B. Hercinothrips femoralis, Thrips tabaci.

Aus der Ordnung der Heteroptera z. B. Eurygaster spp., Dysdercus intermedius, Piesma quadrata, Cimex lectularius, Rhodnius prolixus, Triatoma spp.

65 Aus der Ordnung der Homoptera z. B. Aleurodes brassicae, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Aphis gossypii, Brevicoryne brassicae, Cryptomyzus ribis, Aphis fabae, Doralis pomi, Eriosoma lanigerum, Hyalopterus arundinis, Macrosiphum avenae, Myzus spp., Phorodon humuli, Rhopalosiphum padi, Empoasca spp., Euscelis bilobatus, Nephotettix cincticeps, Lecanium corni, Saissetia oleae, Laodelphax striatellus, Nilaparvata lugens,



Aonidiella aurantii, Aspidiotus hederae, Pseudococcus spp. Psylla spp.

Aus der Ordnung der Lepidoptera z. B. Pectinophora gossypiella, Bupalus piniarius, Cheimatomia brumata, Lithocolletis blancardella, Hyponomeuta padella, Plutella maculipennis, Malacosoma neustria, Euproctis chrysorrhoea, Lymantria spp. Bucculatrix thurberiella, Phyllocnistis citrella, Agrotis spp., Euxoa spp., Feltia spp., Earias insulana, Heliethis spp., Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Panolis flammea, Prodenia litura, Spodoptera spp., Trichoplusia ni, Carpocapsa pomonella, Pieris spp., Chilo spp., Pyrausta nubilalis, Ephestia kuehniella, Galleria mellonella, Tineola bisselliella, Tinea pellionella, Hofmannophila pseudospretella, Cacoecia podana, Capua reticulana, Choristoneura fumiferana, Clysia ambiguella, Homona magnanima, Tortrix viridana.

Aus der Ordnung der Coleoptera z. B. Anobium punctatum, Rhizopertha dominica, Acanthoscelides obtectus, Hylotrupes bajulus, Agelastica alni, Leptinotarsa decemlineata, Phaeton cochleariae, Diabrotica spp., Psylliodes chrysocephala, Epilachna varivestis, Atomaria spp., Oryzaephilus surinamensis, Anthonomus spp., Sitophilus spp., Otiorrhynchus sulcatus, Cosmopolites sordidus, Ceuthorrhynchus assimilis, Hypera postica, Dermestes spp., Trogoderma spp., Anthrenus spp., Attagenus spp., Lyctus spp., Meligethes aeneus, Ptinus spp., Niptus hololeucus, Gibbium psyllodes, Tribolium spp., Tenebrio molitor, Agriotes spp., Conoderus spp., Melolontha melolontha, Amphimallon solstitialis, Costelytra zealandica.

Aus der Ordnung der Hymenoptera z. B. Diprion spp., Hoplocampa spp., Lasius spp., Monomorium pharaonis, Vespa spp.

Aus der Ordnung der Diptera z. B. Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp., Drosophila melanogaster, Musca spp., Fannia spp., Calliphora erythrocephala, Lucilia spp., Chrysomya spp., Cuterebra spp., Gastrophilus spp., Hypoboscia spp., Stomoxys spp., Oestrus spp., Hypoderma spp., Tabanus spp., Tannia spp., Bibio hortulanus, Oscinella frit, Phorbia spp., Pegomyia hyoscyami, Ceratitis capitata, Dacus oleae, Tipula paludosa.

Aus der Ordnung der Siphonaptera z. B. Xenopsylla cheopis, Ceratophyllus spp.

Aus der Ordnung der Arachnida z. B. Scorpio maurus, Latrodectus mactans.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe der Formel (I) zeichnen sich durch eine hervorragende insektizide Wirksamkeit aus. Sie zeigen insbesondere beim Einsatz als Blattinsektizide und Bodeninsektizide eine hervorragende Wirkung gegen Zikaden, wie z. B. Nephrotettix cincticeps, gegen Käferlarven, wie z. B. Phaeton cochleariae und Blattläuse, wie z. B. Myzus persicae und Aphis fabae.

Die neuen Verbindungen sind also besonders gut für einen Einsatz zur Bekämpfung von Blattinsekten und Bodeninsekten geeignet.

Die Wirkstoffe können in die üblichen Formulierungen übergeführt werden, wie Lösungen, Emulsionen, Suspensionen, Pulver, Schäume, Pasten, Granulate, Aerosole, Wirkstoff-impregnierete Natur- und synthetische Stoffe, Feinstverkapselungen in polymeren Stoffen und in Hüllmassen für Saatgut, ferner in Formulierungen mit Brennsätzen, wie Räucherpatronen, -dosen, -spiralen u. ä., sowie ULV-Kalt- und Warmnebel-Formulierungen.

Diese Formulierungen werden in bekannter Weise hergestellt, z. B. durch Vermischen der Wirkstoffe mit Streckmitteln, also flüssigen Lösungsmitteln, unter Druck stehenden verflüssigten Gasen und/oder festen Trägerstoffen, gegebenenfalls unter Verwendung von oberflächenaktiven Mitteln, also Emulgiermitteln und/oder Dispergiermitteln und/oder schaumzeugenden Mitteln. Im Falle der Benutzung von Wasser als Streckmittel können z. B. auch organische Lösungsmittel als Hilfslösungsmittel verwendet werden. Als flüssige Lösungsmittel kommen im wesentlichen in Frage: Aromaten, wie Xylol, Toluol, oder Alkyl-naphthaline, chlorierte Aromaten oder chlorierte aliphatische Kohlenwasserstoffe, wie Chlorbenzol, Chlorethylene oder Methylenchlorid, aliphatische Kohlenwasserstoffe, wie Cyclohexan oder Paraffine, z. B. Erdölfraktionen, Alkohole, wie Butanol oder Glykol sowie deren Ether und Ester, Ketone, wie Aceton, Methyl-ethylketon, Methylisobutylketon oder Cyclohexanon, stark polare Lösungsmittel, wie Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid, sowie Wasser; mit verflüssigten gasförmigen Streckmitteln oder Trägerstoffen sind solche Flüssigkeiten gemeint, welche bei normaler Temperatur und unter Normaldruck gasförmig sind, z. B. Aerosol-Treibgase, wie Halogenkohlenwasserstoffe sowie Butan, Propan, Stickstoff und Kohlendioxid; als feste Trägerstoffe kommen in Frage: z. B. natürliche Gesteinsmehle, wie Kaoline, Tonerden, Talkum, Kreide, Quarz, Attapulgit, Montmorillonit oder Diatomeenerde und synthetische Gesteinsmehle, wie hochdisperse Kieselsäure, Aluminiumoxid und Silikate; als feste Trägerstoffe für Granulate kommen in Frage: z. B. gebrochene und fraktionierte natürliche Gesteine wie Calcit, Marmor, Bims, Sepiolith, Dolomit sowie synthetische Granulate aus anorganischen und organischen Mehlen sowie Granulate aus organischem Material wie Sägemehl, Kokosnußschalen, Maiskolben und Tabakstengel; als Emulgier und/oder schaumzeugende Mittel kommen in Frage: z. B. nichtionogene und anionische Emulgatoren, wie Polyoxyethylen-Fettsäure-Ester, Polyoxyethylen-Fettalkohol-Ether, z. B. Alkylaryl-polyglykol-Ether, Alkylsulfonate, Alkylsulfate, Arylsulfonate sowie Eiweißhydrolysate; als Dispergiermittel kommen in Frage: z. B. Lignin-Sulfitaugaun und Methylcellulose.

Es können in den Formulierungen Haftmittel wie Carboxymethylcellulose, natürliche und synthetische pulverige, körnige oder latexförmige Polymere verwendet werden, wie Gummiarabicum, Polyvinylalkohol, Polyvinylacetat, sowie natürliche Phospholipide, wie Kephaline und Lecithine, und synthetische Phospholipide. Weitere Additive können mineralische und vegetabile Öle sein.

Es können Farbstoffe wie anorganische Pigmente, z. B. Eisenoxid, Titanoxid, Ferrocyanblau und organische Farbstoffe, wie Alizarin-, Azo- und Metallphthalocyaninfarbstoffe und Spurennährstoffe wie Salze von Eisen, Mangan, Bor, Kupfer, Kobalt, Molybdän und Zink verwendet werden.

Die Formulierungen enthalten im allgemeinen zwischen 0,1 und 95 Gew.-% Wirkstoff, vorzugsweise zwischen 0,5 und 90%.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können in ihren handelsüblichen Formulierungen sowie in den aus diesen Formulierungen bereiteten Anwendungsformen in Mischung mit anderen Wirkstoffen, wie Insektiziden, Lockstoffen, Sterilantien, Akariziden, Nematiziden, Fungiziden, wachstumsregulierenden Stoffen oder Herbiziden vorliegen. Zu den Insektiziden zählen beispielsweise Phosphorsäureester, Carbamate, Carbonsäureester, chlo-

rierte Kohlenwasserstoffe, Phenylharnstoffe, durch Mikroorganismen hergestellte Stoffe u. a.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können ferner in ihren handelsüblichen Formulierungen sowie in den aus diesen Formulierungen bereiteten Anwendungsformen in Mischung mit Synergisten vorliegen. Synergisten sind Verbindungen, durch die Wirkung der Wirkstoffe gesteigert wird, ohne daß der zugesetzte Synergist selbst aktiv

5 wirksam sein muß.  
Der Wirkstoffgehalt der aus den handelsüblichen Formulierungen bereiteten Anwendungsformen kann in weiten Bereichen variieren. Die Wirkstoffkonzentration der Anwendungsformen kann von 0,0000001 bis zu 95% Gew.-% Wirkstoff, vorzugsweise zwischen 0,0001 und 1 Gew.-% liegen.

Die Anwendung geschieht in einer den Anwendungsformen angepaßten üblichen Weise.

10 Bei der Anwendung gegen Hygiene- und Vorratsschädlinge zeichnen sich die Wirkstoffe durch eine hervorragende Residualwirkung auf Holz und Ton sowie durch eine gute Alkalistabilität auf gekalkten Unterlagen aus.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe der Formel (I) eignen sich auch zur Bekämpfung von Arthropoden, die landwirtschaftliche Nutztiere, wie z. B. Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde, Schweine, Esel, Kamele, Büffel, Kaninchen, Hühner, Puten, Enten, Gänse, sonstige Haustiere wie z. B. Hunde, Katzen, Stubenvögel, Aquarienfische


15 sowie sog. Versuchstiere, wie z. B. Hamster, Meerschweinchen, Ratten und Mäuse befallen. Durch die Bekämpfung dieser Arthropoden sollen Todesfälle und Leistungsminderungen (bei Fleisch, Milch, Wolle, Häuten, Eiern, Honig usw.) vermindert werden, so daß durch den Einsatz der erfindungsgemäßen Wirkstoffe eine wirtschaftlichere und einfachere Tierhaltung möglich ist.  
Die Anwendung der erfindungsgemäßen Wirkstoffe geschieht im Veterinärsektor in bekannter Weise durch enterale Verabreichung in Form von beispielsweise Tabletten, Kapseln, Tränken, Drenchen, Granulaten, Pasten, Boli, des feed-through-Verfahrens, von Zäpfchen, durch parenterale Verabreichung, wie zum Beispiel durch Injektionen (intramuskulär, subcutan, intravenös, intraperitoneal u. a.), Implantate, durch nasale Applikation, durch dermale Anwendung in Form beispielsweise des Tauchens oder Badens (Dippen), Sprühens (Spray), Aufgießens (Pour-on und Spot-on), des Waschens, des Einpuderns sowie mit Hilfe von wirkstoffhaltigen Formkörpern, wie Halsbändern, Ohrmarken, Schwanzmarken, Gliedmaßenbändern, Halftern, Markierungsvorrichtungen usw.

Sie zeigen insbesondere beim Einsatz als Ektoparasitizide eine ausgezeichnete Wirkung gegen Blowfly-larven wie z. B. *Lucilia cuprina*.

Die biologische Wirksamkeit der erfindungsgemäßen Verbindungen soll anhand der folgenden Beispiele erläutert werden.

#### Herstellungsbeispiele

##### Beispiel 1




(Verfahren (a))

45 2,16 g (0,01 Mol) 1,1-Dimethylthio-4,4,4-trifluor-1-buten-3-on und 1,5 g (0,01 Mol) N-[(Pyrid-3-yl)-methyl]-ethylendiamin werden in 20 ml Xylol 2 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Die heiße Lösung wird filtriert und der beim Abkühlen auskristallisierende Feststoff abgenutscht.

Man erhält so 1,7 g (63% der Theorie) 1-[(Pyrid-3-yl)-methyl]-2-(trifluormethylcarbonylmethylen)-imidazolidin

50 als roter Feststoff vom Schmelzpunkt 157°C.

##### Beispiel 2




(Verfahren (b))

65 Zu einer Lösung von 4,8 g (0,015 Mol) 3-(6-Chlor-pyrid-3-yl)-methyl-2-(trifluormethylcarbonylmethylen)-1,3-thiazolidin und 2,4 g (0,03 Mol) Pyridin in 50 ml Dichlormethan werden bei 20°C–25°C 6,3 g (0,03 Mol) Trifluoressigsäureanhydrid zugegeben und die Mischung 15 Stunden bei 20°C gerührt. Anschließend wird das Lösungsmittel im Vakuum abdestilliert und der Rückstand unter Rühren mit Wasser versetzt. Das ausgefallene Produkt wird abgenutscht, mit Wasser gewaschen und getrocknet.

Man erhält so 5,1 g (80% der Theorie) 2-[(Di-trifluormethylcarbonyl)-methylen]-3-(6-chlor-pyrid-3-yl)-methyl-1,3-thiazolidin als beiger Feststoff vom Zersetzungspunkt 180°C.

## Beispiel 3




## (Verfahren (c))

3,9 g (0,02 Mol) 2-Trifluormethylcarbonylmethylen-1,3-thiazolidin werden in 10 ml Tetrahydrofuran und 20 ml Dimethylformamid bei 25°C portionsweise mit 0,72 g (0,024 Mol) Natriumhydrid (80%ig in Paraffin) versetzt und 15 Minuten auf 70°C erhitzt. Nach dem Abkühlen werden bei 25°C 3,2 g (0,02 Mol) 2-Chlor-5-chlormethylpyridin in 20 ml Tetrahydrofuran zugegeben, 3 Stunden bei 60°C und 15 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Anschließend wird eingengt und der Rückstand mit Wasser verrührt. Das ausgefallene Produkt wird abgesaugt und getrocknet.

Man erhält 5,5 g (85,2% der Theorie) 3-(6-Chlor-pyrid-3-yl)-methyl-2-(trifluormethylcarbonylmethylen)-1,3-thiazolidin vom Schmelzpunkt 101°C.

## Beispiel 4




## (Verfahren (d/a))

12,6 g (0,06 Mol) 1-(6-Chlor-pyrid-3-yl)-methyl-2-methyl-2-imidazolin und 9,5 g (0,12 Mol) Pyridin in 120 ml Dichlormethan werden bei 20°C tropfenweise mit 25,2 g (0,12 Mol) Trifluoressigsäureanhydrid versetzt und 4 Stunden bei 25°C gerührt. Anschließend wird eingengt, mit 300 ml Wasser und 15,5 g (0,18 Mol) Natriumhydrogencarbonat versetzt. Die Mischung wird nach beendeter Zugabe 3 Stunden nachgerührt und das ausgefallene Produkt abgesaugt.

Man erhält 16,4 g (89,5% der Theorie) 1-(6-Chlor-pyrid-3-yl)-methyl-2-(trifluormethylcarbonylmethylen)-imidazolidin vom Schmelzpunkt 135°C.

## Beispiel 5
















## (Verfahren (d/β))

Zu einer Lösung von 2,1 g (0,01 Mol) 1-[6-Chlor-pyrid-3-yl)-methyl-2-methyl-imidazolin und 0,79 g (0,01 Mol) Pyridin in 30 ml Dichlormethan werden 25°C 6,3 g (0,03 Mol) Trifluoressigsäureanhydrid zugetropft und 15 Stunden bei 25°C gerührt. Das Reaktionsgemisch wird eingengt, der Rückstand mit 100 ml Wasser und portionsweise mit 5,0 g (0,06 Mol) Natriumhydrogencarbonat versetzt. Das ausgefallene Produkt wird abgesaugt und getrocknet.


Man erhält 3,0 g (78% der Theorie) 2-[(Di-trifluormethylcarbonyl)-methylen]-3-(6-chlor-pyrid-3-yl)-methyl-imidazolidin vom Schmelzpunkt 181°C.



Tabelle 7


Beisp.-Nr.	Het	R		Y	Physikal. Konstante	
7		H		N	Fp. 83°C	10
8		H		CH	Fp. 154°C	15
9		H		C—CO—CF <sub>3</sub>	Fp. 204°C	20
10		H		CH	Fp. 87°C	25
11		H		CH	*δ = 5,79 (s)	30
12		H		N	Fp. 60–62°C	35

\*Sind die δ-Werte der <sup>1</sup>H-NMR-Spektren, die in CDCl<sub>3</sub> aufgenommen wurden. Angegeben sind die chemischen Verschiebungen für die Gruppierung



Ausgangsverbindung der Formel (III)

Beispiel (III-1)




Zu einer Suspension von 2,4 g (0,1 Mol) Natriumhydrid (80%ig) in Paraffin in 100 ml wasserfreiem Dimethylformamid werden bei 5°C–10°C 5,6 g (0,05 Mol) 1,1,1-Trifluoraceton getropft. Die Mischung wird 20 Minuten ohne Kühlung gerührt und dann mit 20 ml Schwefelkohlenstoff tropfenweise versetzt. Unter Gasentwicklung färbt sich der Reaktionsansatz dunkelrot, die Innentemperatur steigt auf 45°C an. Es wird 2 Stunden bei 45°C–50°C gerührt, anschließend auf 0°C bis 5°C gekühlt und bei maximal 5°C mit 14,2 g (0,1 Mol) Iodmethan versetzt. Nach 16stündigem Rühren bei 25°C wird der Ansatz in 300 ml Eiswasser eingetragen und 2mal mit je 100 ml Dichlormethan extrahiert. Die organische Fase wird über Natriumsulfat getrocknet, das Lösungsmittel

im Vakuum verdampft und der verbleibende Rückstand mit Ether verrührt. Die Etherlösung wird zweimal mit Aktivkohle aufgeköcht, filtriert, und auf ein Volumen von ca. 50 ml eingengt. Das Produkt kristallisiert nach Zugabe von 100 ml Petrolether aus.

Man erhält 3,2 g (29,6% der Theorie) 1,1-Bismethylthio-4,4,4-trifluor-1-buten-3-on als blaßblaue Kristalle vom Schmelzpunkt 96°C.

#### Ausgangsverbindung der Formel (Va)

##### Beispiel (Va-1)




Zu einer Lösung von 6,1 g (0,06 Mol) 2-Methyl-2-thiazolin und 9,5 g (0,12 Mol) Pyridin in 60 ml Dichlormethan werden bei 20°C 25,2 g (0,12 Mol) Trifluoressigsäureanhydrid tropfenweise gegeben. Die Mischung wird 4 Stunden bei 25°C gerührt, dann das Lösungsmittel im Vakuum abdestilliert und zum Rückstand ca. 100 ml Wasser gegeben. Unter Rühren gibt man nach und nach 15,5 g (0,18 Mol) Natriumhydrogencarbonat zu und sammelt den ausgefallenen Feststoff auf einer Nutsche.

Man erhält 9,1 g (77% der Theorie) 2-Trifluormethylcarbonylmethylen-thiazolidin als beigefarbener Feststoff vom Schmelzpunkt 127°C.

#### Ausgangsverbindung der Formel (VII)

##### Beispiel (VII-1)




11,1 g (0,06 Mol) N-[(6-Chlor-pyrid-3-yl)-methyl]-ethylendiamin, 7,2 g (0,06 Mol) Orthoessigsäuretrimethylester und 0,1 g p-Toluolsulfonsäure in 60 ml Xylol werden 8 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Die Mischung wird filtriert, das Lösungsmittel im Vakuum abdestilliert und der Rückstand im Vakuum destilliert.

Man erhält 11,0 g (88% der Theorie) 1-(6-Chlor-pyrid-3-yl)-methyl-2-methyl-2-imidazolin vom Siedepunkt Kp.: 110°C—115°C/202 Hektopascal.

#### Ausgangsverbindungen der Formel (VIII)


##### Beispiel (VIII-1)



Zu einer Lösung von 5,55 g (0,03 Mol) N-[(6-Chlor-pyrid-3-yl)-methyl]-ethylendiamin in 50 ml Methanol werden bei 20°C—25°C 3,2 g Bromcyan in 10 ml Methanol zugetropft. Nach beendeter Zugabe wird 2 Stunden bei 50°C gerührt dann auf 20°C abgekühlt und das ausgefallene Produkt auf einer Nutsche gesammelt.

Man erhält 7,2 g (83% der Theorie) 1-(6-Chlor-pyrid-3-yl)-methyl-2-imino-imidazolin-Hydrobromid vom Zersetzungspunkt 225°C.


##### Beispiel (VIII-2)



9,6 g 2-Aminopyridin und 16,2 g 2-Chlor-5-chlormethylpyridin in 100 ml Ethanol 8 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Nach dem Abkühlen, wird abgesaugt, mit Ethanol gewaschen und getrocknet.

Man erhält 20 g 2-Amino-1-(6-Chlor-pyrid-3-yl)-methyl-pyridiniumchlorid vom Schmelzpunkt 220° — 225° C.

#### Beispiel (VIII-3)




10 g 2-Aminothiazol und 16,2 g 2-Chlor-5-chlormethyl-pyridin in 100 ml Ethanol werden 8 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Nach dem Abkühlen wird abgesaugt, mit Ethanol gewaschen und getrocknet.

Man erhält 23 g 2-Amino-3-(6-chlor-pyrid-3-yl)-methyl-thiazoliumchlorid vom Schmelzpunkt 210° C — 215° C.

#### Verwendungsbeispiele

In den folgenden Verwendungsbeispielen wurde die folgende Verbindung als Vergleichssubstanz eingesetzt:



Tetrahydro-2-nitromethylen-2 H-1,3-thiazin aus US-PS 39 93 648.

#### Beispiel A

##### Nephotettix-Test

Lösungsmittel: 7 Gewichtsteile Dimethylformamid  
Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpolglykolether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit der angegebenen Menge Lösungsmittel und der angegebenen Menge Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

Reiskeimlinge (*Oryza sativa*) werden durch Tauchen in die Wirkstoffzubereitung der gewünschten Konzentration behandelt und mit der Grünen Reiszikade (*Nephotettix cincticeps*) besetzt, solange die Keimlinge noch feucht sind.

Nach der gewünschten Zeit wird die Abtötung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100%, daß alle Zikaden abgetötet wurden; 0% bedeutet, daß keine Zikaden abgetötet wurden.

Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele (3) und (5) bei einer Wirkstoffkonzentration von 0,0001 % nach 6 Tagen eine Wirkung von 90% und 100%, während die Vergleichssubstanz (A) eine Wirkung von 20% zeigt.

#### Tabelle B

##### Aphis-Test (systemische Wirkung)

Lösungsmittel: 7 Gewichtsteile Dimethylformamid  
Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpolglykolether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit der angegebenen Menge Lösungsmittel und der angegebenen Menge Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

Mit je 20 ml Wirkstoffzubereitung der gewünschten Konzentration werden Bohnenpflanzen (*Vicia faba*), die stark von der schwarzen Bohnenlaus (*Aphis fabae*) befallen sind, angegossen, so daß die Wirkstoffzubereitung in den Boden eindringt, ohne den Sproß zu benetzen. Der Wirkstoff wird von den Wurzeln aufgenommen und in den Sproß weitergeleitet.

Nach der gewünschten Zeit wird die Abtötung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100%, daß alle Blattläuse abgetötet wurden; 0% bedeutet, daß keine Blattläuse abgetötet wurden.

Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele (4), (5) und (8) bei einer Wirkstoffkonzentration von 0,01 % nach 4 Tagen eine Wirkung von 100%, während die Vergleichssubstanz (A) eine Wirkung von 50% zeigt.

## Beispiel C

## Grenzkonzentrations-Test/Wurzelsystemische Wirkung

- 5 Testinsekt: Phaedon cochleariae-Larven  
 Lösungsmittel: 3 Gewichtsteile Aceton  
 Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpolyglykolether

10 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit der angegebenen Menge Lösungsmittel, gibt die angegebene Menge Emulgator zu und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

Die Wirkstoffzubereitung wird innig mit Boden vermischt. Dabei spielt die Konzentration des Wirkstoffs in der Zubereitung praktisch keine Rolle, entscheidend ist allein die Wirkstoffgewichtsmenge pro Volumeneinheit Boden, welche in ppm (= mg/l) angegeben wird. Man füllt den behandelten Boden in Töpfe und bepflanzt diese mit Kohl (*Brassica oleracea*). Der Wirkstoff kann so von den Pflanzenwurzeln aus dem Boden aufgenommen und  
 15 in die Blätter transportiert werden.

Für den Nachweis des wurzelsystematischen Effektes werden nach 7 Tagen ausschließlich die Blätter mit den obengenannten Testtieren besetzt. Nach weiteren 2 Tagen erfolgt die Auswertung durch Zählen oder Schätzen der toten Tiere. Aus den Abtötungszahlen wird die wurzelsystematische Wirkung des Wirkstoffs abgeleitet. Sie ist 100%, wenn alle Testtiere abgetötet sind und 0%, wenn noch genau so viele Testinsekten leben wie bei der  
 20 unbehandelten Kontrolle.

Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele (3) und (8) bei einer Wirkstoffkonzentration von 20 ppm eine Wirkung von 100%, während die Vergleichssubstanz (A) keine Wirkung zeigt.

25

## Beispiel D

## Grenzkonzentrations-Test/Wurzelsystemische Wirkung

- 30 Testinsekt: Myzus persicae  
 Lösungsmittel: 3 Gewichtsteile Aceton  
 Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpolyglykolether

35 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit der angegebenen Menge Lösungsmittel, gibt die angegebene Menge Emulgator zu und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

Die Wirkstoffzubereitung wird innig mit Boden vermischt. Dabei spielt die Konzentration des Wirkstoffs in der Zubereitung praktisch keine Rolle, entscheidend ist allein die Wirkstoffgewichtsmenge pro Volumeneinheit Boden, welche in ppm (= mg/l) angegeben wird. Man füllt den behandelten Boden in Töpfe und bepflanzt diese mit Kohl (*Brassica oleracea*). Der Wirkstoff kann so von den Pflanzenwurzeln aus dem Boden aufgenommen und  
 40 in die Blätter transportiert werden.

Für den Nachweis des wurzelsystemischen Effektes werden nach 7 Tagen ausschließlich die Blätter mit den obengenannten Testtieren besetzt. Nach weiteren 2 Tagen erfolgt die Auswertung durch Zählen oder Schätzen der toten Tiere. Aus den Abtötungszahlen wird die wurzelsystemische Wirkung des Wirkstoffs abgeleitet. Sie ist  
 45 100%, wenn alle Testtiere abgetötet sind und 0%, wenn noch genau so viele Testinsekten leben wie bei der unbehandelten Kontrolle.

Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele (3), (4), (5) und (8) bei einer Wirkstoffkonzentration von 20 ppm eine Wirkung von 100%, während die Vergleichssubstanz (A) keine Wirkung zeigt.

50

## Beispiel E

Test mit *Lucilia cuprina* resistent-Larven

- 55 Emulgator: 35 Gewichtsteile Ethylenglykolmonomethylether  
 35 Gewichtsteile Nonylphenolpolyglykolether

60 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man drei Gewichtsteile Wirkstoff mit sieben Gewichtsteilen des oben angegebenen Gemisches und verdünnt das so erhaltene Konzentrat mit Wasser auf die jeweils gewünschte Konzentration.

Etwa 20 *Lucilia cuprina* res.-Larven werden in ein Teströhrchen gebracht, welches ca. 1 cm<sup>3</sup> Pferdefleisch und 0,5 ml der Wirkstoffzubereitung enthält. Nach 24 Stunden wird der Abtötungsgrad bestimmt.

Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele (4), (5), (8) und (9) bei einer Wirkstoffkonzentration von 100 ppm eine Abtötung von 100%.

65